

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нурофен[®] МультиСимптом

наименование лекарственного препарата

таблетки 400 мг + 325 мг

лекарственная форма, дозировка

Хайгланс Лабораториз Pvt. Лтд., Индия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 04 08 14 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Хайрумат	Нурофен[®] МультиСимптом
Nurofen[®] MultiSymptom	Nurofen[®] MultiSymptom
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА
Хайрумат	Нурофен [®] МультиСимптом
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ:	ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ:
ибупрофен + парацетамол	Ибупрофен + Парацетамол
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- головная боль (в том числе мигрень)	- головная боль (в том числе мигрень);
- зубная боль;	- зубная боль;
- альгодисменорея (болезненная менструация);	- альгодисменорея (болезненная менструация);
- невралгия;	- невралгия;
- миалгия;	- миалгия (мышечная боль);
- боли в спине;	- боли в спине;
- суставные боли, болевой синдром при воспалительных и дегенеративных	- суставные боли, болевой синдром при воспалительных и дегенеративных

Старая редакция	Новая редакция
<p>заболеваниях опорно-двигательного аппарата;</p> <p>- боли при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах;</p> <p>- посттравматический и послеоперационный болевой синдром;</p> <p>- лихорадочные состояния (в том числе при гриппе и простудных заболеваниях).</p>	<p>заболеваниях опорно-двигательного аппарата;</p> <p>- боли при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах;</p> <p>- посттравматический и послеоперационный болевой синдром;</p> <p>- лихорадочные состояния (жар).</p> <p>Препарат применяется в качестве симптоматического лечения острых респираторных заболеваний («простуды») и гриппа: лихорадочные состояния (жар), головная боль, мышечная боль.</p> <p>Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования; на прогрессирование заболевания не влияет.</p>
<p>ФОРМА ВЫПУСКА</p> <p>Таблетки 400 мг + 325 мг.</p> <p><i>Для аптек:</i></p> <p>5, 7 или 10 таблеток в ПВХ/Ал блистер или Ал/Ал блистер.</p> <p>1 блистер по 5 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.</p> <p>1, 5 или 10 блистеров по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.</p> <p>1 или 10 блистеров по 7 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.</p> <p>1 блистер по 5, 7 или 10 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку</p>	<p>ФОРМА ВЫПУСКА</p> <p>Таблетки 400 мг + 325 мг.</p> <p>5, 7 или 10 таблеток в ПВХ/Ал блистер или Ал/Ал блистер.</p> <p>1 блистер по 5 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.</p> <p>1, 5 или 10 блистеров по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.</p> <p>1 или 10 блистеров по 7 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.</p> <p>1 или 2 блистера по 5, 7 или 10 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную с перфорацией,</p>

Изменение № 2 к Инструкции С. 3

Старая редакция	Новая редакция
<p>картонную с перфорацией, защищенной пленкой ПВХ с внутренней стороны пачки (2 перфорации в виде овала на пачке по 5 таблеток, 4 перфорации в виде овала на пачке по 7 или 10 таблеток).</p> <p>Для стационаров: 100, 500, 1000 таблеток в пакет полиэтиленовый, 1 пакет вместе с инструкцией по применению в банку из полиэтилена высокой плотности. На банку наклеивают этикетку.</p>	<p>защищенной пленкой ПВХ с внутренней стороны пачки (2 перфорации в виде овала на пачке по 5 таблеток, 4 перфорации в виде овала на пачке по 7, 10, 14 или 20 таблеток).</p> <p>Для стационаров: 100, 500, 1000 таблеток в пакет полиэтиленовый, 1 пакет вместе с инструкцией по применению в банку из полиэтилена высокой плотности. На банку наклеивают этикетку.</p>
<p>ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ</p> <p>Раздел отсутствует</p>	<p>ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ</p> <p>Рекитт Бенкизер Хелскэр (Великобритания) Лимитед, 103-105, Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Великобритания</p>
<p>Претензии потребителей направлять по адресу:</p> <p>Представитель в РФ, странах СНГ и Балтии. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 13 а, стр.3</p> <p>Тел/факс: (495) 940-33-12, 940-33-13, 940-33-14, 940-33-96, 940-33-97, 940-33-98.</p> <p>E-mail: rus@higlance.ru</p> <p>Наш сайт: www.higlance.ru.</p>	<p>Представитель в России/ адрес для предъявления претензий</p> <p>ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» Россия, 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 14</p> <p>Тел: 8-800-505-1-500 (звонок по России бесплатный), contact_ru@reckittbenckiser.com</p>

Менеджер по регистрации
ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



А.В. Самочернова

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 001514-040814
СОГЛАСОВАНО

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 3 стр
менеджер по регистрации
Самочернова Анастасия

